

Памятка

ОПЕРАЦИИ В КЛИНИКЕ ВЕГА. ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!



- 6 СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
- 20 КЛЕТОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
- 2 АППАРАТА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
- ГАЗОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ

1 ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ:

- Подготовьте список вопросов и задайте их хирургу и анестезиологу. Вам подробно расскажут о проведении операции, анестезии и всех рисках.
- Также могут потребоваться дополнительные исследования (кардиологическое обследование, анализы крови, рентгенография, УЗИ и др.).
- Если ваш питомец принимает какие-то препараты, заранее узнайте у анестезиолога, нужно ли их отменить до операции или наоборот, нельзя отменять!
- Если ваш питомец тяжело переносит посещение ветеринарных клиник – за несколько дней начните давать успокоительные препараты (наши врачи подберут препарат и график приема).

2 В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ:

- Рано утром (6-7ч) покормите своего питомца небольшим количеством привычного корма.
- При необходимости дайте медикаменты (если назначен ветмедин – обязательно примите его в день операции!)
- Прием питомцев осуществляется в первой половине дня, далее все животные размещаются в специальных клетках в стационаре, и составляется операционный план - в зависимости от срочности операций и состояния питомцев.
- Днем в отделении ваш питомец никогда не будет один: 6 сотрудников следят за состоянием каждого животного.

3 ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ:

- С вами обязательно свяжется врач после операции, либо отправит сообщение. Если что-то пойдет не так, с вами свяжутся раньше.
- Врач отдельно скажет время, когда питомца можно забирать домой, это зависит от длительности пробуждения, и общего самочувствия пациента.

4

НАКОНЕЦ, ДОМА:

- В норме питомец может оставаться более вялым до суток после анестезии
- Подкашливание – связано с установкой специальной трубки в трахею для дыхания во время анестезии. Должно пройти в течение 2-3 суток.
- В день операции может наблюдаться 1-2 кратная рвота. Если рвота появилась по приезде домой и ваш питомец НЕ относится к брахецефалическим породам – допустимо ничего с этим не делать. Если рвота многократная или ваш питомец обладатель короткой мордочки – следует обратиться в клинику.
- Если вы владелец кошки, НЕ зависимо от ее породы, возраста, кардиологического обследования – **ОБЯЗАТЕЛЬНО** после любой анестезии следить за ее дыханием.
- При возникновении одышки (дышит тяжело и часто в спокойном состоянии) – незамедлительно обратиться в клинику к дежурному врачу.
- Рекомендуем также регулярно считать частоту дыхания во сне – в норме до 27 дыхательных движений в фазе глубокого сна (1 счет = вдох+выдох).

ВНИМАНИЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, ВЫДАННЫЕ ВАМ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ!(НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ВОРОТНИКА; КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ШВОВ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ – ОБРАБОТКИ; ПРИЕМ НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ; И ДР)

- Кормить можно сразу по приезде домой. Первое кормление рекомендуется примерно 1\3 от привычной порции, далее – кормление в обычном режиме
- Свежая чистая вода в свободном доступе.
- Первые 2-3 суток после операции обращайтесь внимание на цвет внешних слизистых оболочек (поднимите губу и посмотрите на цвет десны на ее беспигментных участках) – если слизистая белесая, синеватая, желтушная или ярко-красная – обратитесь в клинику!

НА ВТОРЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВАС ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ:

- Полное отсутствие жажды и\или аппетита даже на любимую пищу\лакомства
- Отсутствие мочеиспускания или его учащение (в норме 2-4 раза в сутки)
- Отсутствие дефекации более 2-3 суток
- Продолжающаяся рвота
- Заваливание при ходьбе, нарушение походки (за исключением случаев после ортопедических операций)
- Болевой синдром (больше лежит; прижатые к голове уши; беспокоится; скулит; плачет; бережет место оперативного вмешательства – вплоть до проявления агрессии при дотрагивании; не реагирует на раздражители, на кличку; не ест) - следует обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии!

